



VAR A DENSITE.14. HEC.ESCP

ENONCE DE L'EXERCICE

ENONCE-14

Soit X_1, \dots, X_n des variables aléatoires indépendantes, définies sur le même espace probabilisé, admettant toutes une même densité f , continue sur \mathbb{R} et strictement positive. On note F leur fonction de répartition.

On pose $U_n = \min(X_1, \dots, X_n)$ et $V_n = F(U_n)$.

Déterminer la fonction de répartition de U_n et celle de V_n . Que remarque-t-on ?

Eléments de correction : 14.

- Détermination de la fonction de répartition F_n de U_n

Notons F la fonction de répartition commune des X_k pour $1 \leq k \leq n$.

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) &= P(U_n \leq x) \\ &= 1 - P(U_n > x) \\ &= 1 - P(X_1 > x \cap X_2 > x \cap \dots \cap X_n > x) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > x) \quad \text{par indépendance des variables} \\ &= 1 - \left(P(X_1 > x)\right)^n \quad \text{les variables suivent la même loi}\end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) = 1 - (1 - F(x))^n$$

- Détermination de la fonction de répartition G_n de $V_n = F(U_n)$

On sait, d'après le cours, que F est continue sur \mathbb{R} et strictement croissante puisque $f > 0$. Il en résulte que F réalise une bijection de \mathbb{R} sur $]0; 1[$.

Donc, $V_n(\Omega) =]0; 1[$ et par conséquent,

$$\forall x \leq 0, G_n(x) = 0 \text{ et } \forall x \geq 1, G_n(x) = 1.$$

$$\begin{aligned}\forall x \in]0; 1[, G_n(x) &= P(F(U_n) \leq x) \\ &= P(F^{-1}(F(U_n)) \leq F^{-1}(x)) \quad \text{car } F^{-1} \text{ est strictement croissante} \\ &= P(U_n \leq F^{-1}(x)) \\ &= F_n(F^{-1}(x)) \\ &= 1 - (1 - F(F^{-1}(x)))^n \quad \text{d'après la question précédente} \\ &\forall x \in]0; 1[, G_n(x) = 1 - (1 - x)^n\end{aligned}$$

$$\text{Finalement } G_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - (1 - x)^n & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On remarque que la loi de V_n est indépendante de celle des X_k .