

Ensembles normaux pour une application

Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal.

Soit f une application de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(F)$ vérifiant les deux conditions suivantes :

$$f(\emptyset) = \emptyset \quad \text{et} \quad \forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, \quad f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

1. Montrer l'implication : $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$. [S]

2. En déduire : $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. [S]

On suppose, dans la suite du problème, que f satisfait à la troisième condition :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \text{Card}(f(A)) \geq \text{Card}(A)$$

3. On dit que A est *normal* (sous-entendu pour f) si $\text{Card}(f(A)) = \text{Card}(A)$.

(a) Montrer que \emptyset et E sont normaux. [S]

(b) Montrer que si A et B sont normaux, $A \cup B$ et $A \cap B$ sont normaux. [S]

(c) Montrer que si A et B sont normaux, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. [S]

4. Parmi tous les sous-ensembles normaux non vides de E , soit A_0 de cardinal minimum.

(a) Soit A un sous-ensemble normal de E . Montrer que $A \supset A_0$ ou $A \cap A_0 = \emptyset$. [S]

(b) Soient α un élément de A_0 et β un élément de $f(\{\alpha\})$.

On pose $E' = E - \{\alpha\}$ et $F' = F - \{\beta\}$.

On définit une application g de $\mathcal{P}(E')$ dans $\mathcal{P}(F')$ par :

$$\forall C \in \mathcal{P}(E'), g(C) = f(C) \cap F'$$

Montrer que g vérifie les trois conditions analogues à celles de f .

Indication : pour la troisième condition, on pourra considérer une partie A de E' et discuter suivant que A est ou n'est pas normal pour f . [S]

(c) En déduire qu'il existe une bijection $\varphi : E \rightarrow F$ telle que : $\forall x \in E, \varphi(x) \in f(\{x\})$.

Indication : procéder par récurrence sur l'entier $n = \text{Card } E = \text{Card } F$. [S]