

Puissances d'une matrice à paramètres

Soient α et β deux réels.

Soit f l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 de matrice $M = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & -1 \\ 2 & \alpha & \beta \\ -3 - \beta & -1 & \alpha \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

- A quelle condition sur α, β l'application f est-elle un automorphisme de \mathbb{R}^3 ? [S]
 - Calculer les valeurs propres de f . [S]
 - Déterminer les sous-espaces propres de f . [S]
 - L'application f est-elle diagonalisable? [S]
- On pose $u = (1, -2 - \beta, 1)$, $v = (0, -2, -1)$ et $w = (1, 1 - \beta, -2)$.
 - Montrer que u, v, w forment une base de \mathbb{R}^3 . [S]
 - Montrer que $(f - (\alpha - 1)\text{Id})^2$ est de rang 1. [S]
 - Vérifier que u et v forment une base de $\ker(f - (\alpha - 1)\text{Id})^2$. [S]

3. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 - \beta & -2 & 1 - \beta \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

- Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} . [S]
- Déterminer la matrice N de f dans la base (u, v, w) . [S]
- Calculer N^n pour tout entier n de \mathbb{N} . [S]
- En déduire M^n pour tout entier n de \mathbb{N} . [S]

4. On veut retrouver M^n par une autre méthode. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & \beta \\ -3 - \beta & -1 & 1 \end{pmatrix}$

- Calculer A^n , pour tout entier naturel n . [S]
- Montrer que $M^n = \varphi(n)A^2 + n(\alpha - 1)^{n-1}A + (\alpha - 1)^n I_3$, où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. [S]
- Calculer $\varphi(n)$, pour tout n de \mathbb{N} , et retrouver ainsi une expression de M^n . [S]

Corrigé du problème

1. (a) On calcule le déterminant de la matrice M :

$$\det M = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & -1 \\ 2 & \alpha & \beta \\ -3 - \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha(\alpha^2 + \beta) + (2 - \alpha(3 + \beta)) = \alpha^3 - 3\alpha + 2 = (\alpha - 1)^2(\alpha + 2)$$

L'application f est un automorphisme de $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \det M$ est non nul, c'est-à-dire $\Leftrightarrow \alpha$ n'est pas élément de $\{1, -2\}$. [Q]

- (b) Le polynôme caractéristique de f (de M) est :

$$\begin{aligned} \chi(\lambda) &= \det(M - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} \alpha - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & \alpha - \lambda & \beta \\ -3 - \beta & -1 & \alpha - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\alpha - \lambda - 1)^2(\alpha - \lambda + 2) = -(\lambda - (\alpha + 2))(\lambda - (\alpha - 1)) \end{aligned}$$

(On s'est servi du fait que $\chi(\lambda)$ se distingue de $\det M$ en remplaçant α par $\alpha - \lambda$)
Les valeurs propres de f sont les racines de $\chi(\lambda)$, c'est-à-dire $\lambda = \alpha - 1$ et $\lambda = \alpha + 2$. [Q]

- (c) Le vecteur $a = (x, y, z)$ est dans le sous-espace propre pour $\lambda = \alpha - 1$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(a) &= (\alpha - 1)a \Leftrightarrow (M - (\alpha - 1)I_3)[a] = \vec{0} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & \beta \\ -3 - \beta & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ 2x + y + \beta z = 0 \\ -(3 + \beta)x - y + z = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = -(\beta + 2)z \end{cases} \end{aligned}$$

On obtient la droite vectorielle engendrée par $(1, -2 - \beta, 1)$.

Le vecteur $a = (x, y, z)$ est dans le sous-espace propre pour $\lambda = \alpha + 2$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(a) &= (\alpha + 2)a \Leftrightarrow (M - (\alpha + 2)I_3)[a] = \vec{0} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & \beta \\ -3 - \beta & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + z = 0 \\ 2x - 2y + \beta z = 0 \\ (3 + \beta)x + y + 2z = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y = (1 - \beta)x \\ z = -2x \end{cases} \end{aligned}$$

On obtient la droite vectorielle engendrée par $(1, 1 - \beta, -2)$. [Q]

- (d) La somme des dimensions des sous-espaces propres de f est égale à 2 (donc strictement inférieure à la dimension de \mathbb{R}^3).

On en déduit que f n'est pas diagonalisable. [Q]

2. (a) La matrice de (u, v, w) dans la base canonique est $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 - \beta & -2 & 1 - \beta \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$