

## Fonction Zéta de Riemann

Pour  $x$  réel, on pose  $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ . On définit ainsi la fonction *Zeta* de Riemann.

### Partie I

Dans cette partie, on étudie sommairement les variations de la fonction  $\zeta$ .

1. Quel est le domaine de définition de la fonction  $\zeta$ ? [S]
2. Montrer que la fonction  $\zeta$  est strictement décroissante. [S]
3. En déduire que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = +\infty$ . [S]
4. (a) Montrer que pour tout  $x \geq 2$  et tout  $N \geq 1$  on a :  $1 \leq \zeta(x) \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ . [S]  
(b) En déduire que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$ . [S]
5. Montrer que la fonction  $\zeta$  est convexe. [S]
6. Montrer que  $\zeta$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et que :  $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x > 1, \zeta^{(p)}(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^p}{n^x}$ .

Retrouver ainsi le résultat des questions 2 et 5. [S]

7. Représenter sommairement la courbe représentative de la fonction  $\zeta$ . [S]

### Partie II

Dans cette partie, on étudie plus précisément le comportement de la fonction  $\zeta$  en 1 et en  $+\infty$ , et on établit sa dérivabilité à tout ordre.

1. Pour  $n \geq 2$  et  $x > 0$ , montrer les inégalités  $\int_n^{n+1} t^{-x} dt \leq n^{-x} \leq \int_{n-1}^n t^{-x} dt$ . [S]
2. En déduire que pour  $x > 1$  et  $N \geq 2$  on a :  $\frac{N^{1-x}}{x-1} \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^x} \leq \frac{(N-1)^{1-x}}{x-1}$ . [S]
3. Montrer que lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ , alors  $\zeta(x) - 1 \sim 2^{-x}$ . [S]
4. Déduire de la question II-2 que  $\zeta(x) \sim \frac{1}{x-1}$  quand  $x$  tend vers 1. [S]

### Partie III

Dans cette partie, on améliore le résultat de la question II-4

On définit une série de fonctions  $\sum f_n$  par :  $f_n(x) = n^{-x} - \int_n^{n+1} t^{-x} dt$ .

1. Montrer que la suite de terme général  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$  est convergente.

Sa limite est notée  $\gamma$  et on l'appelle la *constante d'Euler* ( $\gamma \approx 0.5772156649$ ). [S]



2. Prouver que pour  $n \geq 1$  et  $x > 0$  on a :  $0 \leq f_n(x) \leq n^{-x} - (n+1)^{-x}$ . [S]
3. Montrer que la série de fonctions  $\sum f_n$  est convergente sur  $]0, +\infty[$ . [S]
4. Soit  $S$  la somme de la série  $\sum f_n$  sur  $\mathbb{R}^{+*}$ .  
Montrer que  $S(1) = \gamma$  et donner l'expression de  $S(x)$  quand  $x > 1$ . [S]
5. Prouver que la convergence de la série  $\sum f_n$  est uniforme sur  $[1, +\infty[$ . [S]
6. En déduire que lorsque  $x$  tend vers 1 alors  $\zeta(x) - \frac{1}{x-1}$  tend vers  $\gamma$ . [S]