

## Quelques propriétés des fonctions harmoniques à deux variables

Dans ce problème,  $\Omega$  est un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ .

Pour  $k$  dans  $\mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R})$  l'algèbre des applications de classe  $\mathcal{C}^k$  de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ .

Soit  $f$  dans  $\mathcal{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ . Le laplacien de  $f$  est l'application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :  $\Delta(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ .  
 $f$  est dite *harmonique* si  $\Delta f \equiv 0$ . On note  $\mathcal{H}(\Omega, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions harmoniques sur  $\Omega$ .

### I. Question de cours : le laplacien en polaires

Soit  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $\varphi(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ . On pose 
$$\begin{cases} \mathcal{U} = \{(\rho, \theta), \rho > 0, -\pi < \theta < \pi\} \\ \Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0), x \leq 0\} \end{cases}$$

Soit  $f$  une application définie sur  $\Omega$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

Soit  $F$  définie sur  $\mathcal{U}$  par  $F = f \circ \varphi$ .

Pour tout point  $(x, y)$  de  $\Omega$ , on a donc  $f(x, y) = F(\rho, \theta)$  avec  $(x, y) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ .

1. Montrer que  $\varphi$  est un difféomorphisme de classe  $\mathcal{C}^\infty$  de  $\mathcal{U}$  sur  $\Omega$ . Préciser  $\varphi^{-1}$ . [S]
2. On suppose que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\Omega$ . L'application  $F$  est donc de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathcal{U}$ .  
Exprimer les dérivées partielles premières de  $f$  en fonction de celles de  $F$ . [S]
3. On suppose que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\Omega$ . L'application  $F$  est donc de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathcal{U}$ .  
Exprimer  $\Delta f$  en fonction des dérivées partielles premières et secondes de  $F$ . [S]

### II. Quelques exemples de fonctions harmoniques

Dans le reste du problème, il est demandé de ne pas chercher à utiliser les résultats de la partie I.

1. Dans cette question,  $\Omega$  désigne l'ouvert  $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ .
  - (a) Montrer que l'application  $f : (x, y) \mapsto \arctan(y/x)$  est harmonique sur  $\Omega$ . [S]
  - (b) Réciproquement, déterminer les applications  $f$  de  $\mathcal{H}(\Omega, \mathbb{R})$  pour lesquelles il existe une application  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , de classe  $\mathcal{C}^2$ , telle que  $f(x, y) = \varphi(y/x)$  pour tout  $(x, y)$  de  $\Omega$ . [S]
2. Dans cette question,  $\Omega$  désigne l'ouvert  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ . On note  $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ .
  - (a) Montrer que l'application  $(x, y) \mapsto \ln r(x, y)$  est harmonique sur  $\Omega$ . [S]
  - (b) Réciproquement, déterminer les applications  $f$  de  $\mathcal{H}(\Omega, \mathbb{R})$  pour lesquelles il existe une application  $\varphi : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ , de classe  $\mathcal{C}^2$ , telle que :  $\forall (x, y) \in \Omega, f(x, y) = \varphi(r(x, y))$ . [S]

### III. Opérations sur les fonctions harmoniques

1. Montrer que  $\mathcal{H}(\Omega, \mathbb{R})$  est un sous-espace vectoriel mais pas une sous-algèbre de  $\mathcal{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$ . [S]
2. Soit  $f$  un élément de  $\mathcal{C}^m(\Omega, \mathbb{R})$ , avec  $m \geq 3$ . Soit  $p$  un entier tel que  $1 \leq p \leq m - 2$ .  
Soi  $g$  une application dérivée partielle d'ordre  $p$  de  $f$ . Montrer que  $g$  est harmonique.  
Indication : utiliser une récurrence finie sur l'ordre de dérivation. [S]
3. Dans cette question,  $f, g, h$  sont des applications de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ , à valeurs réelles.  
On suppose que l'application  $f$  est harmonique.  
On suppose qu'on a les égalités  $\frac{\partial g}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial h}{\partial y}$  et  $\frac{\partial g}{\partial y} = -\varepsilon \frac{\partial h}{\partial x}$ , avec  $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ .
  - (a) Montrer que les applications  $g$  et  $h$  sont harmoniques. [S]
  - (b) Montrer que  $F$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $F(x, y) = f(g(x, y), h(x, y))$  est harmonique. [S]
  - (c) Montrer que l'application  $gh$  est harmonique. [S]
  - (d) Soit  $\varphi$  une similitude affine de  $\mathbb{R}^2$ . Montrer que  $F = f \circ \varphi$  est harmonique sur  $\mathbb{R}^2$ . [S]

#### IV. Fonctions polynomiales harmoniques

On note  $\mathcal{P}$  l'ensemble des fonctions polynomiales sur  $\mathbb{R}^2$ , c'est-à-dire l'ensemble des applications  $f$  définies par  $f(x, y) = \sum_{p, q \geq 0} \lambda_{p, q} x^p y^q$ , où les  $\lambda_{p, q}$  sont réels (tous nuls sauf un nombre fini d'entre eux.)

L'ensemble  $\mathcal{P}$  est une algèbre sur  $\mathbb{R}$ , et les fonctions monômes  $(x, y) \mapsto x^p y^q$  en constituent une base.

Pour tout  $m$  de  $\mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}_m$  l'ensemble des fonctions polynomiales homogènes de degré  $m$  :

Autrement dit,  $f \in \mathcal{P}_m \Leftrightarrow \exists (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^{m+1}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \sum_{k=0}^m \lambda_k x^k y^{m-k}$ .

L'ensemble  $\mathcal{P}$  est la somme directe de ses sous-espaces vectoriels  $\mathcal{P}_m$ .

On note  $\mathcal{Y} = \mathcal{P} \cap \mathcal{H}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions polynomiales harmoniques.

On note  $\mathcal{Y}_m = \mathcal{Y} \cap \mathcal{P}_m$  l'ensemble des fonctions polynomiales harmoniques homogènes de degré  $m$ .

Il est clair que  $\mathcal{Y}$  et  $\mathcal{Y}_m$  sont des sous-espaces vectoriels respectifs de  $\mathcal{P}$  et de  $\mathcal{P}_m$ .

1. (a) Préciser une base et la dimension de l'espace vectoriel  $\mathcal{P}_m$ , pour  $m$  dans  $\mathbb{N}$ . [S]

(b) Indiquer la dimension et une base de  $\mathcal{Y}_0$  et de  $\mathcal{Y}_1$ . [S]

(c) Soit  $m$  un entier supérieur ou égal à 2 et  $f$  un élément de  $\mathcal{P}_m$ .

Il existe donc  $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m)$  dans  $\mathbb{R}^{m+1}$  tel que :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \sum_{k=0}^m \lambda_k x^k y^{m-k}$ .

Indiquer les conditions sur les  $\lambda_k$  pour que  $f$  soit harmonique.

En considérant l'application qui à  $f$  associe  $(\lambda_0, \lambda_1)$ , montrer que  $\dim \mathcal{Y}_m = 2$ . [S]

(d) Soit  $m \geq 2$ . On définit  $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  par :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x + iy)^m = f(x, y) + ig(x, y)$ .

Montrer que  $f$  et  $g$  forment une base de  $\mathcal{Y}_m$ .

Expliciter par exemple une base de  $\mathcal{Y}_2$  et une base de  $\mathcal{Y}_5$ . [S]

2. Soit  $f$  dans  $\mathcal{P}_m$ . Si  $m \geq 1$ , vérifier que  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$  sont dans  $\mathcal{P}_{m-1}$ .

Montrer que pour tout point  $(x, y)$  de  $\mathbb{R}^2$ , on a l'égalité  $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = mf(x, y)$ . [S]

3. Soit  $m$  un entier strictement positif et  $p$  un élément de  $\mathcal{Y}_m$ .

Pour tout réel  $\lambda$ , et tout  $(x, y)$  de  $\mathbb{R}^2$ , on pose  $h_\lambda(x, y) = xp(x, y) - \lambda(x^2 + y^2) \frac{\partial p}{\partial x}(x, y)$ .

(a) Vérifier que l'application  $h_\lambda$  est dans  $\mathcal{P}_{m+1}$ . [S]

(b) Montrer que  $\Delta h_\lambda = 2(1 - 2m\lambda) \frac{\partial p}{\partial x}$ . [S]

(c) En déduire :  $\exists (h, g) \in \mathcal{Y}_{m+1} \times \mathcal{P}_{m-1}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xp(x, y) = h(x, y) + (x^2 + y^2)g(x, y)$ .

Remarquer (sans reprendre les calculs précédents) qu'on arrive à une conclusion analogue en considérant l'application définie par  $(x, y) \mapsto yp(x, y)$ . [S]

4. Pour simplifier les notations, on note  $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  pour tout  $(x, y)$  de  $\mathbb{R}^2$ .

(a) Soit  $f$  dans  $\mathcal{P}_2$ . Montrer qu'il existe  $\lambda$  unique dans  $\mathbb{R}$  tel que  $h = f - \lambda r^2$  soit dans  $\mathcal{Y}_2$ . [S]

(b) On se donne un entier  $m \geq 2$  et  $f$  dans  $\mathcal{P}_m$ . Montrer  $\exists (h, g) \in \mathcal{Y}_m \times \mathcal{P}_{m-2}, f = h + r^2 g$ .

Indication : raisonner par récurrence sur  $m$ , en utilisant (IV 2) et (IV 3c).

En raisonnant sur les dimensions montrer que cette décomposition de  $f$  est unique. [S]

(c) Soit  $m$  dans  $\mathbb{N}$  et  $f$  dans  $\mathcal{P}_m$ . Montrer que  $f$  s'écrit de façon unique  $f = \sum_{0 \leq k \leq m/2} r^{2k} h_{m-2k}$ , où chaque  $h_{m-2k}$  est dans  $\mathcal{Y}_{m-2k}$ . Indication : récurrence sur  $m$ . [S]

## Corrigé du problème

### Question de cours : le laplacien en polaires

1. L'application  $\varphi$  est évidemment de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

On se donne  $(x, y)$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$  privé de la demi-droite  $(x \leq 0, y = 0)$ .

Si on cherche  $\rho$  dans  $\mathbb{R}^{+*}$  et  $\theta$  dans  $] -\pi, \pi[$ , alors on trouve :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ x + \rho = 2\rho \cos^2 \frac{\theta}{2} \\ y = 2\rho \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \frac{\theta}{2} = \frac{y}{x + \rho} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = 2 \arctan \frac{y}{x + \rho} \end{cases}$$

Ainsi  $\varphi$  est une bijection de  $\mathcal{U}$  dans  $\Omega$ , et les calculs précédents montrent que la bijection réciproque est donnée par  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$  et  $\theta = 2 \arctan \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$

Les deux applications  $(x, y) \mapsto \rho(x, y)$  et  $(x, y) \mapsto \theta(x, y)$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $\mathcal{U}$  (comme résultant d'opérations et de compositions de fonctions de classe  $C^\infty$ .)

Conclusion : l'application  $\varphi$  est un difféomorphisme de classe  $C^\infty$  de  $\mathcal{U}$  sur  $\Omega$ . [Q]

2. On différencie le changement de variables et on inverse le système obtenu :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = \cos \theta d\rho - \rho \sin \theta d\theta \\ dy = \sin \theta d\rho + \rho \cos \theta d\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d\rho = \cos \theta dx + \sin \theta dy \\ d\theta = -\frac{\sin \theta}{\rho} dx + \frac{\cos \theta}{\rho} dy \end{cases}$$

$$\text{On en déduit : } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial \rho} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial F}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial \rho} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial F}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{cases} \quad [\text{Q}]$$

3. On interprète le résultat précédent comme des relations entre opérateurs de dérivation partielle.

$$\text{On écrit donc : } \frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta} \text{ et } \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

Pour calculer la dérivée partielle seconde  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  on applique cet opérateur à  $\frac{\partial f}{\partial x}$ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = \left( \cos \theta \frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left( \cos \theta \frac{\partial F}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right) \\ &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \cos \theta \frac{\partial F}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right) - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \cos \theta \frac{\partial F}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial \rho^2} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho^2} \frac{\partial F}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} \frac{\partial^2 F}{\partial \rho \partial \theta} \\ &\quad + \frac{\sin^2 \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} \frac{\partial^2 F}{\partial \rho \partial \theta} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho^2} \frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial \rho^2} + \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} - 2 \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho} \frac{\partial^2 F}{\partial \rho \partial \theta} + 2 \frac{\sin \theta \cos \theta}{\rho^2} \frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\rho} \frac{\partial F}{\partial \rho} \end{aligned}$$