



Table des matières

I	Équations différentielles linéaires d'ordre 1	2
II	“Équadiffs” linéaires d'ordre 2 à coefficients constants	4

I Équations différentielles linéaires d'ordre 1

Dans ce chapitre, \mathbb{K} désigne \mathbb{R} ou \mathbb{C} . Soit J un intervalle de \mathbb{R} d'intérieur non vide.

Soient a, b, c trois applications continues sur J , à valeurs dans \mathbb{K} .

Dans cette section, on note (E) l'équation : $a(x)y' + b(x)y = c(x)$.

On dit que (E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

On note (H) l'équation différentielle : $a(x)y' + b(x)y = 0$ (*équation homogène* associée à (E).)

Important : les résultats concernant (E) et (H) supposent qu'on se place sur un sous-intervalle I de J sur lequel la fonction $x \mapsto a(x)$ ne s'annule pas. Pour résoudre (E) ou (H) sur J tout entier, il faudra procéder intervalle par intervalle (entre deux zéros successifs de a), et vérifier ensuite s'il est possible de "recoller" des solutions sur des intervalles consécutifs.

Proposition (*solution générale de (H)*)

On considère (H) : $a(x)y' + b(x)y = 0$, sur un intervalle I où $a(x)$ ne s'annule pas.

La solution générale de (H) sur I est donnée par $y(x) = \lambda e^{-B(x)}$, où B est une primitive particulière de $x \mapsto \frac{b(x)}{a(x)}$ sur I , et où λ est un scalaire quelconque.

Remarques et exemples

– Le résultat précédent montre que l'ensemble \mathcal{S}_H des solutions y de (H) sur I est égal à l'ensemble des multiples d'une solution particulière y_0 non nulle de (H) sur I .

On exprime cette situation en disant que \mathcal{S}_H est une *droite vectorielle*. On voit d'ailleurs qu'une solution de (H) sur I , si elle n'est pas la solution nulle, ne s'annule jamais sur I .

– Si on "devine" une solution non nulle de (H) sur I , alors on connaît la solution générale (sans avoir à passer par la formule précédente.)

On constate par exemple que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est solution de (H) : $xy' + y = 0$ sur \mathbb{R}^{-*} et sur \mathbb{R}^{+*} .

Sur $I = \mathbb{R}^{-*}$ ou \mathbb{R}^{+*} , la solution générale de (H) est donc l'ensemble des $x \mapsto \frac{\lambda}{x}$, ($\lambda \in \mathbb{K}$).

Proposition (*solution générale de (E)*)

On considère (E) : $a(x)y' + b(x)y = c(x)$, sur un intervalle I où $a(x)$ ne s'annule pas.

La solution générale de (E) sur I est donnée par $y(x) = (C(x) + \lambda)e^{-B(x)}$, où B est une primitive particulière de $x \mapsto \frac{b(x)}{a(x)}$ sur I , λ est un scalaire quelconque, et C est une primitive particulière de $x \mapsto \frac{c(x)}{a(x)}e^{B(x)}$ sur I .

Remarques

– L'expression précédente montre que pour obtenir la solution générale \mathcal{S}_E de (E) sur I , il suffit d'ajouter à une solution particulière de (E) sur I la solution générale de (H) sur I .

– Par exemple, une solution particulière de (E) : $xy' + y = 2x$ est l'application $x \mapsto x$.

La solution générale de (E) sur $I = \mathbb{R}^{+*}$ ou \mathbb{R}^{-*} est donc $y(x) = x + \frac{\lambda}{x}$, avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

– Autre exemple : considérons l'équation (E) : $\cos(x)y' + \sin(x)y = 1$, sur $I =] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Une solution particulière de (E) (resp. de (H)) sur I est $x \mapsto \sin(x)$ (resp. $x \mapsto \cos(x)$).

La solution générale de (E) sur I s'écrit donc $y(x) = \sin(x) + \lambda \cos(x)$, avec $\lambda \in \mathbb{K}$.