



EXERCICES DE MATHEMATIQUES



ALGEBRE LINEAIRE

ENONCE DE L'EXERCICE

ENONCE :

ENONCE-12

Soit (a_0, a_1, \dots, a_n) , $n + 1$ réels distincts ($n \in \mathbb{N}$).

1) On considère l'application φ de $\mathbb{R}_n[X]$ dans \mathbb{R}^{n+1} définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \varphi(P) = (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n)).$$

Montrer que φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ sur \mathbb{R}^{n+1} et donner sa matrice dans les bases canoniques des deux espaces vectoriels.

2) Soit (R_0, R_1, \dots, R_n) une famille de polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ tels que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on ait $\deg(R_k) = k$.

Montrer par récurrence sur n que cette famille est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, notée \mathcal{B} .

3) Soit P un polynôme de degré n .

On considère la famille $(P, P', \frac{P''}{2!}, \dots, \frac{P^{(n)}}{n!})$.

a) Montrer que cette famille est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, notée \mathcal{B}_1 .

b) Soit P un polynôme de degré n . Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, Q_k est le polynôme défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, Q_k(x) = P(x + a_k).$$

- Montrer que les coordonnées de Q_k dans la base \mathcal{B}_1 sont $(1, a_k, \dots, a_k^n)$.
- Montrer que la famille (Q_0, Q_1, \dots, Q_n) est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (on pourra utiliser : ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$).

4) Soit P un polynôme de degré n . On considère les familles de nombres distincts suivantes : (x_0, x_1, \dots, x_n) et (y_0, y_1, \dots, y_n) .

Montrer que la matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$, où $a_{i,j} = P(x_i + y_j)$ est inversible.

INDICATIONS DE SOLUTION