www.KlubPrepa.net
l'internet dédié aux prépas HEC

ESSEC

CONCOURS D'ADMISSION DE 1999

Option économique

Mathématiques III

Vendredi 21 Mai 1999 de 8h à 12h

LES ANNALES

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d'aucun document; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Exercice I : Etude du tri dichotomique.

Dans cet exercice, on considère un nombre entier naturel n et le nombre entier $N = 2^n$.
Dans N cases numérotées 1, 2, … , N sont rangées N fiches (à raison d'une fiche par case) qui contiennent des informations dont un nombre noté $F[1]$ pour la fiche rangée dans la case 1, $F[2]$ pour la fiche rangée dans la case 2, … , $F[N]$ pour la fiche rangée dans la case N.
Ces fiches peuvent représenter les clients d'une entreprise et les nombres $F[1]$, $F[2]$, … , $F[N]$ les montants des commandes passées par ces clients, ou bien les candidats à un concours et les nombres $F[1]$, $F[2]$, … , $F[N]$ les totaux des points obtenus par ces candidats, etc.
L'objectif est ici de "trier ces N fiches", autrement dit de les ranger dans les cases de façon à ce que les nombres $F[1]$, $F[2]$, … , $F[N]$ soient dans l'ordre croissant.
Si par exemple les fiches considérées sont celles des N candidats à un concours, on cherche donc à les ranger dans l'ordre croissant des totaux obtenus (de façon à ce que la première fiche soit donc celle d'un candidat avec le plus faible total, la dernière celle d'un candidat avec le plus fort total).
On étudie maintenant un algorithme très performant de tri («tri dichotomique») de ces N fiches.

1°) Tri des fiches de deux tas de fiches déjà triés.
On considère deux tas *triés* de fiches (ce qui signifie qu'à l'intérieur de chacun des deux tas, les fiches sont rangées dans l'ordre croissant des nombres $F[i]$). L'objectif est ici de réunir les fiches de ces deux tas en un seul tas *trié* (à l'intérieur duquel les fiches seront donc rangées dans l'ordre croissant des nombres $F[i]$).

a) Soient deux tas triés contenant respectivement p fiches et 1 fiche.
On compare successivement l'unique fiche du second tas aux fiches du premier tas afin d'obtenir un seul tas trié de $p+1$ fiches. Déterminer alors le nombre maximal des comparaisons de fiches nécessaires à l'obtention d'un seul tas trié de $p+1$ fiches.

Des méthodes, des exercices, des corrigés sur le www.KlubPrepa.net

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.

www.KlubPrepa.net
l'internet dédié aux prépas HEC

b) Soient deux tas triés contenant respectivement p fiches et q fiches.
Raisonnant par récurrence sur q, on suppose qu'un majorant du nombre des comparaisons de fiches nécessaires pour réunir en un seul tas trié de $p+q$ fiches ces deux tas triés est $p+q-1$.
Soient deux tas triés (dans l'ordre croissant) contenant respectivement p fiches et $q+1$ fiches.
On compare successivement la première fiche du second tas aux fiches du premier tas.
Il existe donc un nombre entier k ($1 \leq k \leq p+1$) tel que cette fiche se classe en $k^{ième}$ position de ce premier tas trié. On place cette fiche en $k^{ième}$ position du premier tas qui contient alors $p+1$ fiches, le second tas ne contenant plus que q fiches. Déterminer en fonction de k:
- le nombre de comparaisons de fiches nécessaires à la recherche de ce nombre entier k.
- un majorant du nombre des comparaisons de fiches nécessaires pour réunir en un seul tas trié les $p+1-k$ dernières fiches triées restant dans ce premier tas et les q fiches triées restant dans le second tas.
- un majorant du nombre des comparaisons de fiches nécessaires pour réunir en un seul tas trié de $p+q+1$ fiches les deux tas triés initialement donnés. Conclure.

c) En déduire enfin un majorant du nombre des comparaisons de fiches nécessaires pour réunir en un seul tas trié de $2N$ fiches deux tas triés de N fiches. Ce majorant peut-il être atteint?

2°) L'algorithme du tri dichotomique.

a) On considère 4 fiches, que l'on trie de la façon suivante:
- on constitue deux tas, formés des 2 premières fiches et des 2 dernières fiches.
- on trie chacun de ces tas, ce qui nécessite une comparaison de fiches dans chacun d'eux.
- on réunit ces deux tas triés en un seul tas trié, à l'aide de la méthode de la question 1.

Combien de comparaisons de fiches doit-on faire au plus pour trier ainsi ces 4 fiches?

b) On considère 8 fiches que l'on trie de la façon suivante:
- on constitue deux tas, formés des 4 premières fiches et des 4 dernières fiches.
- on trie chacun de ces tas à l'aide de l'algorithme expliqué précédemment.
- on réunit ces deux tas triés en un seul tas trié, à l'aide de la méthode de la question 1.

Combien de comparaisons de fiches doit-on faire au plus pour trier ainsi ces 8 fiches?

c) En poursuivant de même, combien de comparaisons de fiches doit-on faire au plus pour trier 16 fiches, 32 fiches, 64 fiches?

d) On revient aux conditions données au début de l'énoncé et, pour trier les $N = 2^n$ fiches, on procède comme suit:
- on constitue deux tas, formés des 2^{n-1} premières fiches et des 2^{n-1} dernières fiches.
- on trie chacun de ces tas à l'aide de l'algorithme expliqué précédemment.
- on réunit ces deux tas triés en un seul tas trié, à l'aide de la méthode de la question 1.

On convient alors de noter u_n le nombre maximum de comparaisons de fiches nécessaires au tri de ces 2^n fiches à l'aide de cet algorithme et l'on pose $v_n = u_n/2^n$. Déterminer:
- les valeurs de u_1, u_2 et u_3 (et on pose bien entendu $u_0 = 0$).
- l'expression de u_n en fonction de u_{n-1} et n, puis l'expression de $v_n - v_{n-1}$ en fonction de n.
- la valeur de v_n en fonction de n, puis la valeur de u_n en fonction de n.
- le nombre maximum de comparaisons de fiches ainsi nécessaires au tri de $N = 2^n$ fiches exprimé en fonction de n, puis de N, et un équivalent de celui-ci quand N tend vers $+\infty$.

e) Indiquer le résultat des actions effectuées par le passage dans la boucle intérieure, puis extérieure de l'algorithme suivant, et préciser le nombre de comparaisons de fiches réalisées:

Pour i := N-1 à 1 faire:
  Pour j := 1 à i faire:
    Si $F[j] > F[j+1]$ alors échanger les fiches j et $j+1$.

Comparer cet algorithme "naïf" au précédent. Qu'obtient-on, par exemple, pour $N = 1024$?

LES ANNALES

Des méthodes, des exercices, des corrigés sur le www.KlubPrepa.net

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.

www.KlubPrepa.net
l'internet dédié aux prépas HEC

LES ANNALES

Exercice II : Algèbre linéaire et analyse.

Dans cet exercice, l'espace vectoriel $\mathbf{R}^2$ est rapporté à sa base canonique B et on identifie:
- tout vecteur de $\mathbf{R}^2$ à la matrice colonne V de ses composantes x et y dans B.
- tout endomorphisme de $\mathbf{R}^2$ à sa matrice M dans B.

Pour tout vecteur V ou pour toute matrice M, on désigne par $\phi(V)$ ou $\phi(M)$ la somme des carrés des deux composantes de V ou des quatre coefficients de M.

On note enfin T l'ensemble des matrices réelles M d'ordre 2 telles que :
- M est symétrique.
- M est nulle ou est de rang égal à 1.
- M a des valeurs propres positives ou nulles.

1°) Exemples de matrices appartenant ou non à T.

Etudier l'appartenance à T des trois matrices A, B, C définies par :

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \quad ; \quad B=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix} \quad ; \quad C=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}.$$

2°) Etude des matrices appartenant à T.

a) Pour tout vecteur V de composantes x, y appartenant à $\mathbf{R}^2$, on pose $M = V\,{}^tV$ où ${}^tV$ désigne la transposée de V.
- Comparer $\phi(M)$ et $[\phi(V)]^2$ et montrer que M est nulle si et seulement si V est nul.
- Montrer que $MV = \phi(V)V$ et que $M^2 = \phi(V)M$.
- Déterminer en fonction de V les valeurs propres et les vecteurs propres de M pour $V \neq 0$.
- Etablir que M appartient à T.

b) On considère réciproquement une matrice M non nulle de T.
- Montrer qu'il existe un vecteur non nul X appartenant à $\mathbf{R}^2$ tel que $\mathrm{Im}M = \mathrm{Vect}(X)$, puis un vecteur non nul Y appartenant à $\mathbf{R}^2$ tel que $M = X\,{}^tY$.
- Montrer, en utilisant la symétrie de la matrice M, qu'il existe un nombre réel non nul λ tel que $Y = \lambda X$.
- Montrer enfin que λ est strictement positif et en déduire l'existence d'un vecteur non nul V tel que $M = V\,{}^tV$.

c) On considère l'application f associant à tout vecteur V de $\mathbf{R}^2$ la matrice carrée $f(V) = V\,{}^tV$.
- f est-elle surjective de $\mathbf{R}^2$ dans T?
- f est-elle injective de $\mathbf{R}^2$ dans T?

3°) Approximation d'une matrice symétrique d'ordre 2 par une matrice de T.

On considère dans cette question deux nombres réels p, q tels que $0 < p < q < 1$ et $p + q = 1$ et la matrice symétrique A définie par:

$$A=\begin{bmatrix}p & q\\ q & p\end{bmatrix}.$$

L'objectif de cette question est de trouver les matrices M appartenant à T qui minimisent l'expression $\phi(A - M)$.

a) La matrice A appartient-elle à T?

b) On désigne par x, y les composantes d'un vecteur V. Expliciter la matrice $A - V\,{}^tV$, puis exprimer en fonction de x, y:

$$F(x, y) = \phi(A - V\,{}^tV).$$

c) Calculer les dérivées partielles de F par rapport aux deux variables x et y, puis en déduire deux conditions nécessaires pour que F présente un extremum en (x, y).

Des méthodes, des exercices, des corrigés sur le www.KlubPrepa.net

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.

www.KlubPrepa.net
l'internet dédié aux prépas HEC

d) Résoudre le système d'équations suivant:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x}(x,y)+\dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y)=0. \\ \dfrac{\partial F}{\partial x}(x,y)-\dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y)=0. \end{cases}$$

e) Donner un équivalent de $F(x, x) - F(0, 0)$ et de $F(x, -x) - F(0, 0)$ quand x tend vers 0. F présente-t-elle un extremum en $(0, 0)$?

f) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de F en (x, x), en déduire les extrema locaux de F et indiquer s'il s'agit ou non de minima.

g) Etablir pour tout couple (x, y) de nombres réels l' égalité suivante:

$$F(x,y)=(x^2+y^2-1)^2+2q(x-y)^2+(q-p)^2.$$

En déduire le minimum de l'expression $\phi(A - V^tV)$ lorsque V décrit l'ensemble des vecteurs de $\mathbf{R}^2$ ainsi que les vecteurs V qui réalisent ce minimum.

h) Prouver enfin qu'il existe une matrice M appartenant à T et une seule qui minimise l'expression $\phi(A - M)$.

On précisera la nature de l'endomorphisme de $\mathbf{R}^2$ représenté par cette matrice M.

LES ANNALES

Des méthodes, des exercices, des corrigés sur le www.KlubPrepa.net

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.

ANNALES DE MATHEMATIQUES 1999

ESSEC : MATH III

CORRIGE

EXERCICE–I

QUESTION–1

1–a)

Au plus, il faudra comparer la fiche du second tas aux p fiches du premier (c'est le cas où la fiche du second tas contient un numéro strictement supérieur à tous ceux du premier tas).

Le nombre maximal de comparaisons est p.

1–b)

Notons $F[i]$ le nombre porté par la fiche numéro i du premier tas, $G[j]$ le nombre porté par la fiche numèro j du deuxième tas.

Si $G[1]$ est placé en k ème position $k \leq p$ dans le premier tas, c'est qu'il a été comparé à $F[1],\ F[2], \ldots, F[k-1]$, que l'on a constaté que $G[1] > F[k-1]$ et $G[1] < F[k]$.

Il y a donc eu k comparaisons.

On sait que $\forall j > 1,\ G[j] > G[1]$ puisque le second tas est trié : les q fiches restant dans le second tas ne seront comparées qu'aux $p-(k-1)$ dernières fiches du second tas : on a en effet la situation suivante :

$F[1] < \ldots < F[k-1] < G[1] < F[k] < \ldots < F[p]$.

Il s'agit bien de placer les q fiches du second tas par rapport aux fiches $F[k],\ \ldots,\ F[p]$ qui sont au nombre de $p-(k-1) = p-k+1$.

Nous sommes donc ramenés à ranger $p-k+1+q$ fiches.

D'après l'hypothèse de récurrence portant sur q, un majorant du nombre de comparaisons est $p-k+1+q-1 =$ $p+q-k$.

Nous avons, pour en arriver là, effectué k comparaisons pour placer $G[1]$; le nombre maximum de comparaisons que l'on aura alors à faire, pour ranger toutes les fiches, est $p+q-k+k = p+q$.

Conclusion : Deux tas triés contiennent respectivement p et q fiches. Un majorant du nombre de comparaisons à effectuer pour former un seul tas trié est $p+q-1$.

Tous droits de l'auteur des oeuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des oeuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.

Ce résultat a été obtenu par récurrence sur q, l'initialisation a été faite au 1–a) et l'hérédité vient d'être prouvée au 1–b).

1–c)

D'après le résultat précédent, un majorant du nombre de comparaisons à effectuer pour ranger les $2N$ fiches est $\boxed{2N-1.}$

Reprenons les notations $F[i]$ et $G[j]$.

$2N-1 = N-1+N$. Or $N-1$ est le nombre d'intervalles entre les nombres $F[1]$, $F[2]$,..., $F[N]$.

Si $G[1]$ se place entre $F[1]$ et $F[2]$, c'est qu'il a fallu 2 comparaisons : $G[1] > F[1]$ et $G[1] < F[2]$;

Si $G[2]$ se place entre $F[2]$ et $F[3]$, c'est qu'il a fallu 2 comparaisons : $G[2] > F[2]$ et $G[2] < F[3]$.

D'une manière générale, si pour $\forall j \in [\![1, N-1]\!]$, $G[j]$ se place entre $F[j]$ et $F[j+1]$, c'est qu'il a fallu 2 comparaisons : $G[j] > F[j]$ et $G[j] < F[j+1]$.

Cela fait déjà $2(N-1) = 2N-2$ comparaisons pour intercaler les $N-1$ premiers termes $G[1]$, ..., $G[N-1]$ dans les $N-1$ intervalles qu'il y a entre les N termes du tas $F[1]$, ..., $F[N-1]$.

Reste à placer $G[N]$: Comme $G[N-1] < F[N]$ et $G[N-1] < G[N]$, il suffit de comparer $G[N]$ et $F[N]$.

La situation est alors la suivante :

$$F[1] < G[1] < F[2] < G[2] < \ldots < F[N-1] < G[N].$$

Si $G[N] < F[N]$, alors $G[N]$ s'intercalle entre $G[N-1]$ et $F[N]$,

Si $G[N] > F[N]$, alors $G[N]$ se place après $F[N]$; une seule comparaison suffit alors.

Le nombre de comparaisons effectuées est $2N-1$.
$2N-1$ est donc le maximum de comparaisons possibles.

QUESTION–2

2–a)

On effectue deux comparaisons pour trier chacun des tas. Puis pour reunir ces deux tas triés en un seul trié par la méthode précédente, il faudra au plus $2 \times 2 - 1 = 3$ comparaisons.

Au total, il faut au plus 5 comparaisons.

2–b)

On forme deux tas de 4 fiches chacun. Par la méthode du **a)**, il faut au plus 5 comparaisons pour trier chacun des deux tas, soit au plus 10 pour les deux tas.

Puis, pour réunir ces deux tas triés en un seul tas trié, il faudra au plus $2 \times 4 - 1 = 7$ comparaisons.

Au total, il faut au plus $10 + 7 = 17$ comparaisons.

2–c)

Pour trier 16 fiches, on fait deux paquets de 8 fiches, ce qui donne au plus 17 comparaisons par paquet ; on réunit ces deux paquets triés en un seul, ce qui donne au plus $2 \times 8 - 1 = 15$ comparaisons.

© EDUKLUB SA
Tous droits de l'auteur des oeuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des oeuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 16 pages.